

26. *N. obscurus* Müll.
27. *Cochlicopa lubrica* Müll.
28. *Pupa doliolum* Brug. immer mut. *albina*.
29. *P. muscorum* L.
30. *P. pusilla* Müll.
31. *Balea perversa* L.
32. *Clausilia laminata* Mont.
33. *Cl. ventricosa* Drap. neu für diese Gegend; nur in 1 Exemplare gefunden.
34. *Cl. lineolata* Held.
35. *Cl. dubia* Drap.
36. *Cl. bidentata* Ström.
37. *Cl. parvula* Stud.
38. *Cl. biplicata* Mont.
39. *Succinea putris* L.
40. *Carychium minimum* Müll.
41. *Ancylus fluviatilis* Müll.

---

### Newe tunisische Unionen.

Von  
W. Kobelt.

---

#### *Unio Micelii n. sp.*

Concha transverse ovata, fere rhomboidea, valde inaequilatera, solida, ponderosa, ruditer irregulariterque sulcato-costulata, olivaceo-nigricans; margo superior arcuatus postice descendens, inferior strictus, pone medium subretusus, anterior subcompressus, breviter rotundatus, oblique in inferum abiens; posterior in rostrum rectum, vix attenuatum, dein rotundato-truncatum productus. Umbones ante  $\frac{1}{3}$  longitudinis siti, tumidi, intorti, parum prominuli, in speciminibus exstantibus erosi; ligamentum elongatum, crassum; lunula lanceolata, inter umbones intrans. Cardo crassus; dens valvae

dextrae crassus, pyramidalis, postice incisione distincta triangulari a margine cardinali dilatato sejunctus, dentes valvae sinistrale compressi, crenati, sulco angusto divis, sed divergentes, anterior subduplex; lamellae humiles, solidae; impressiones musculares anteriores magnae, profundae, subintrantes, posteriores superficiales; linea pallearis distinctissima, crenata; callus humeralis crassissimus, ultra medium productus, dimidiad faciei internae occupans; margarita rosacea.

Long. 92, alt. 45, crass. 32 mm.

Hab. in flumine Medjerda Tunisiae.

*Unio Medjerdae n. sp.*

Concha elongato-ovata, valde inaequilatera, solida, ponderosa, ruditer striata, olivaceo-nigrescens; margo superior arcuatus, ascendens, inferior strictiusculus, pone medium subretusus, anterior compressus, oblique in inferiorem desinens, posterior in rostrum breve depresso desinens. Umbones ad  $\frac{1}{3}$  longitudinis siti, tumidi, antice rectangulatim truncati, depresso, contigui; ligamentum crassum elongatum, sinu brevissimo; lunula rhomboidea brevis, inter umbones vix intrans. — Cardo sat fortis; dens valvae dextrae crassus, subcompressus, rotundato-triangularis, crenatus, fossula distincta sat profunda antice, et incisione distincta a margine cardinali sejunctus, dentes valvae sinistrale approximati, subcompressi, fovea cardinali laterali vix discreti, subdivergentes; lamellae crassae, elatae, dextra cultellata; impressiones musculares anteriores profundae, sat magnae, subintrantes, posteriores superficiales; impressio pallearis distincta, crenulata; callus humeralis crassus, marginem inferiorem totum occupans; margarita carnea.

Long. 84, alt. 48, crass. 32 mm.

Hab. in flumine Medjerda Tunisiae.

---